

El cuidado de su niño después de la circuncisión



Children's
Hospital
LOS ANGELES®

We Treat Kids Better

El cuidado de su niño después de la circuncisión

La circuncisión es un modo como los médicos eliminan el prepucio del pene.

Actividades:

- Para los lactantes mayores, juegos tranquilos como caminar y salir con un familiar que los vigile. No participar en juegos rudos ni juguetes de montar como caballos de balancín o bicicletas por lo menos 4 a 8 semanas después de la cirugía.
- Los bebés pueden hacer lo mismo que antes de la cirugía, como usar un columpio o asiento para bebés.

El baño:

- Dele a su niño un baño de esponja por los primeros 7 días después de la cirugía.
- No lo haga sentarse en la tina. Use un paño limpio y agua tibia para limpiarlo.
- Su niño puede usar la regadera o el baño que acostumbra siete días después de la cirugía.
- Si se le colocó un vendaje, se lo puede quitar un día después de la cirugía. Las suturas se van a disolver completamente más o menos a las 4 o 6 semanas.
- No use agua muy caliente.

Los medicamentos para el dolor:

- Dele a su niño Acetaminofén (como Tylenol®) si tiene dolor.
- Para el dolor que no mejora con el Acetaminofén simple, dele a su niño Acetaminofén con Codeína (si es lo que ordenó el doctor) la siguiente vez, en lugar del Acetaminofén simple.

- No le dé Acetaminofén más veces de lo que recomienda el frasco o como se lo indicó el médico.
- Muchos de los medicamentos que se venden sin receta también contienen Acetaminofén (Tylenol®). Dígale a su doctor si su niño está tomando otros medicamentos recetados o sin receta.
- Su médico también podría ordenar Ibuprofen para el dolor.
- Use un hisopo limpio para poner un poco de Bacitracin® en el pene con cada cambio de pañal, 3 veces al día por 7 días. Asegúrese de lavarse las manos con jabón y agua tibia antes y después de este paso.
- Si su médico le ordenó antibióticos, asegúrese de tomar todos los medicamentos a menos que el doctor le diga que los suspenda
- Tome todos los medicamentos como fueron ordenados por su médico.



Haga esta llamada la primera semana

Su niño va a necesitar ver a su médico unas 4 o 6 semanas después de la cirugía. Por favor llame al (323) 361-2247 para hacer una cita.

Cuándo llamar al doctor:

- Si su niño tiene fiebre mayor de 101.5° F
- Por enrojecimiento, hinchazón o exudación del sitio de la cirugía.
- Si tiene preguntas o preocupaciones

De lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm, llame al
(323) 361-7559

Fuera de esas horas y los fines de semana, llame al
(323) 660-2450 y pida que le llamen al Residente de Cirugía
de turno.

4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org

© 2014 Children's Hospital Los Angeles