

Los cuidados de su niño después de la reparación de Hipospadias



Children's
Hospital
LOS ANGELES®

We Treat Kids Better

Los cuidados de su niño después de la reparación de Hipospadias

El Hipospadias ocurre cuando la entrada de la uretra (la abertura por donde sale la orina) no está en su posición normal en la punta del pene. La cirugía se hace para mover la abertura a su posición normal.



Actividades:

- No puede participar en juegos bruscos, correr ni educación física en la escuela por lo menos durante ó a 8 semanas.
- Su niño puede volver a sus actividades normales después de ó a 8 semanas.
- No levantar pesos de más de 5 libras.

Baño:

- Durante los primeros 7 días después de la cirugía, déle baños de esponja
 - o Para el baño de esponja, no lo siente en la tina; use una toalla limpia y agua tibia para limpiarlo.
- No use agua muy tibia o caliente durante los primeros 7 días después de la cirugía.
- El doctor le dirá cuándo quitar el vendaje y cuándo su niño se puede bañar o duchar como antes.

Los medicamentos para el dolor:

- Déle a su niño Acetaminofén (como Tylenol®) según lo necesite para el dolor.
- Si el dolor no mejora con el Acetaminofén simple, déle a su niño Acetaminofén (Tylenol®) con codeína (si se lo indicó el doctor), la próxima vez que tenga dolor en vez del Acetaminofén simple.
- No le dé el Acetaminofén más veces de las recomendadas en el frasco o como se lo haya ordenado su médico.
- Muchos de los medicamentos que se compran sin receta también contienen Acetaminofén (Tylenol®). Dígale a su doctor si su niño está tomando otros medicamentos recetados o sin receta.
- Su doctor también podría recetarle Ibuprofen para el dolor.
- Su doctor podría recetarle Ditropan para los espasmos de la vejiga.
- Si el doctor le indicó antibióticos, por favor asegúrese de tomarse toda la medicina a menos que su doctor le diga que la suspenda.
- Tome todos los medicamentos como se los ordenó el doctor.



Haga esta llamada la primera semana después de la cirugía

Su niño va a necesitar ver a su doctor en aproximadamente 4 a 6 semanas después de la cirugía. Favor de llamar al 323-361-2247 para hacer una cita.

Cuándo llamar al doctor:

- Por fiebre mayor de 101.5° F (38.5 grados centígrados)
- Si la herida se abre.
- Por enrojecimiento o hinchazón en la zona de la cirugía.
- Si su niño tiene una sonda (pequeño tubo plástico en el pene) y se le sale. No a todos los niños se les pone una sonda para esta cirugía.
- Si tiene alguna pregunta o preocupación.

De lunes a viernes, de 8 am a 4:30 pm, llamar al (323) 361-7559.

Los fines de semana o por las noches, llame al (323) 660-2450 y pregunte por el residente de Urología de turno.