

# Los cuidados de su niño después de la cirugía de orquidopexia



We Treat Kids Better

## Los cuidados de su niño después de la cirugía de orquidopexia

La cirugía de orquidopexia se hace para colocar dentro del escroto a un testículo no descendido; esto es, cuando el testículo no está dentro de la bolsa escrotal. Durante este procedimiento, el testículo no descendido se coloca en su posición normal en el escroto.

### Actividad:

- No juegos rudos ni deportes de contacto por 4 a 6 semanas después de la cirugía. Esto incluye andar en bicicleta, juguetes de montar y otras actividades en las que los genitales se pueden lesionar.
- Los protectores deben usarse siempre durante las actividades deportivas para el resto de la vida de su niño. Si tiene preguntas sobre este tema, por favor hable con su médico en la próxima consulta post-operatoria.

### Baño:

- Dele a su niño un baño de esponja por los primeros 7 días después de la cirugía.
- Para el baño de esponja, no lo deje sentarse en la tina. Use una toalla limpia y agua tibia para bañarlo.
- No use agua muy tibia o caliente por los primeros 7 días después de la cirugía.
- Su médico le va a indicar cuándo le puede quitar el vendaje.
- Su niño se puede bañar en la regadera o su baño habitual siete días después de la cirugía.

## Los medicamentos para el dolor:

- Dele a su niño Acetaminofén (como Tylenol®) si lo necesita para el dolor.
- Para el dolor que no mejora con el Acetaminofén simple, dele Acetaminofén (Tylenol®) con codeína, si fue ordenado por su doctor, la próxima vez en lugar del Acetaminofén simple.
- No le dé Acetaminofén más veces de lo recomendado en el frasco o como lo ordenó su médico.
- Muchos medicamentos que se venden sin receta también tienen Acetaminofén (Tylenol®) Dígale a su médico si su niño está tomando otras medicinas recetadas o sin receta.
- Su doctor puede también ordenar Ibuprofén para el dolor
- Si su doctor ordenó antibióticos, asegúrese de tomar todo el medicamento a menos que su médico le ordene suspenderlos.



## Haga esta llamada la primera semana después de la cirugía

Su niño necesitará ver a su doctor alrededor de 4 a 6 semanas después de la cirugía. Por favor, llame al (323) 361- 2247 para hacer una cita.

### Cuando llamar al doctor:

- Por fiebre mayor de 101.5° F
- Por cualquier sangrado, aumento en el enrojecimiento o hinchazón del sitio de la cirugía.
- Si tiene preguntas o preocupaciones

De lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm, llamar al (323) 361-7559.

Fuera de estas horas o fines de semana, llame al (323) 660-2450 y pida que le llamen al residente de Urología de turno.