

## CALENDARIO DE VACUNACIÓN RECOMENDADO

## **DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 2 AÑOS**

Varicela		Hepatitis B tres veces	
☐ Entre los 12 y los 15 meses		☐ Poco después de nacer ☐ Entre el primero y el	☐ Entre los 6 y los 18 meses
Difteria, tétanos y tosferina (DTaP) cuatro veces		segundo mes	
2 meses 6 meses		Sarampión, paperas y rubéolo	, (MMR)
$\square$ 4 meses	☐ Entre los 15 y los 18 meses	☐ Entre los 12 y los 15 meses	
<b>0</b> :		= 21110 103 12 y 103 10 1110300	•
Gripe una vez al año a finales de octubre a ser posible		Antineumocócica (PCV13) cuatro veces	
☐ A partir de los 6 meses		2 meses	☐ 6 meses
Haemophilus influenzae de tipo b (Hib) tres a cuatro veces		4 meses	☐ Entre los 12 y los 15 meses
según la marca (infección habitual de las vías respiratorias altas		A se le tret timati.	
que puede provocar una meningitis)		Antipoliomielítica (IPV) tres ve	
☐ 2 meses	☐ 6 meses	☐ 2 meses ☐ 4 meses	☐ Entre los 6 y los 18 meses
☐ 4 meses	(según la marca) □ Entre los 12 y los 15 meses	□ 4 meses	
_ 4 meses		Antirrotavírica (RV) dos o tres veces según la marca	
Hepatitis A dos veces		Marca Rotarix	Marca RotaTeq
☐ Entre los 12 y los 23 me	eses	☐ 2 meses	☐ 2 meses
☐ Segunda dosis: 6 meses	s después de la primera	☐ 4 meses	4 meses
			☐ 6 meses
DESDE LOS 3 H.	ASTA LOS 10 AÑOS		
Varicela		Sarampión, paperas y rubéola (MMR)	
☐ Entre los 4 y los 6 años		☐ Entre los 4 y los 6 años	
Difteria, tétanos y tosferina (DTaP)		Antipoliomielítica (IPV)	
☐ Entre los 4 y los 6 años		☐ Entre los 4 y los 6 años	
·			
<b>Gripe</b> una vez al año a fin	ales de octubre a ser posible		
□ Todos los años			
DESDE LOS 11 H	HASTA LOS 18 AÑOS		
Gripe una vez al año a finales de octubre a ser posible		Antineumocócica del serogrupo B (MenB)	
□ Todos los años		☐ Entre los 16 y los 23 años	
Virus del papiloma humano (HPV) dos veces		Tétanos, difteria y tosferina (Tdap) la vacuna de refuerzo	
□ Entre los 11 y los 12 años		☐ Entre los 11 y los 12 años	
□ Entre los 6 y los 12 meses después de la dosis inicial			
Antineumocócica conjugada: dos veces			
		Fuente: Centras nara al Conti	rol y la Prevención de Enfermedades
Lillie los 11 y los 12 dh	a los 16 años	i denie. Ceniros para el Conti	or y la rrevención de Ememiedades